

## NEMATODES ANTI-PAPILLON ET CHARANCON ROUGE DU PALMER

### Utilisation

Le nématode *Steinernema carpocapsae* se déplace dans les cavités et irrégularités du palmier à la recherche de larves de charançon rouge du palmier et de papillon ravageur du palmier. Il s'introduit dans le corps du ravageur afin de procréer, ce qui entrainera sa mort dans les jours suivants.

Ils sont livrés en sachet de 25 millions de nématodes mélangés à la poudre d'argile, à diluer dans l'eau selon les indications fournies et à appliquer au moyen d'un arrosoir ou d'un pulvérisateur.

Etant donné que le charançon rouge du palmier dévore le coeur de la plante hôte, les signes les plus visibles des attaques n'apparaissent souvent que bien après le début de l'infestation. Il est possible de détecter la présence de charançon rouge au moyen d'un piège de détection à combiner avec une phéromone attractive. C'est pourquoi, un remboursement de 5€ sur un piège à charançon + phéromone Protecta est offert à l'achat d'une boîte de nématodes.

### Méthode d'application

- 1 - Arroser l'arbre ou les arbres à traiter (10 litres d'eau 30 minutes avant)
- 2 - Diluer le contenu d'un sachet dans au moins 5 L d'eau
- 3 - Mélanger 3 minutes pour mettre les nématodes en suspension
- 4 - En cas de forte infestation, passer à l'étape 5. En cas d'infestation moyenne, compléter le mélange avec 5L d'eau (traitement de 2 palmiers) ou 7L d'eau (traitement de 3 palmiers) et agiter de nouveau.
- 5 - Pulvériser le mélange sur le haut du tronc (stipe) sur un mètre jusqu'au bourgeon terminal (l'apex), en insistant au niveau de la couronne (insertion des palmes sur le stipe). Continuer à agiter le mélange pour éviter le dépôt des nématodes dans le fond de l'appareil.
- 6 - Les nématodes doivent être renouvelés après 1 mois.

**Dose recommandée :** 25 millions pour 1 à 3 palmiers.

**Période d'application :** Avril à Octobre quand les températures du sol sont comprises entre 12°C et 25°C.

### Fonctionnement

La boîte d'achat contient un bon de réduction à l'achat d'un piège à charançon Protecta, une notice explicative ainsi qu'un code de commande. Les nématodes doivent être commandés sur le site [www.protecta-insects.eu](http://www.protecta-insects.eu) dès les premiers signes d'infestation. Les auxiliaires sont expédiés chaque lundi, mardi et mercredi et livrés dans les 48 à 72h après expédition.

Si les nématodes ne peuvent pas être installés dès réception, il est possible de les stocker au réfrigérateur jusqu'à la date limite d'utilisation mentionnée sur le sachet.

Produit utilisable en agriculture biologique conformément à la réglementation européenne en vigueur



#### SUPPORT

1 sachet de 25M de nématodes

#### CIBLE

Papillons et charançon rouge du palmier

#### USAGE

Grand public

#### ZONES D'UTILISATION

Palmiers

#### RÉFÉRENCE

PV-AUX-02002 : 6/carton