



DESRIPTIF PRODUIT

Support	Talc
Utilisation	Barrière physique
Cible	Mouches piqueuses
Usages	Grand public et Professionnels
Zones d'utilisation	Organes végétatifs
Référence(s)	PV-PVD-02001 : 1,5kg 6/carton PV-PVD-02004: 10kg PV-PVD-02007 : 25kg

UTILISATION

Le Talc PROTECTA, issu d'une roche broyée, s'utilise en pulvérisation pour former une barrière protectrice sur les organes végétatifs. S'applique au stade jeunes fruits pour prévenir des dégâts liés aux coups de soleil.

METHODE D'APPLICATION / DOSE

Le Talc PROTECTA est composé d'éléments d'une granulométrie adaptée à la plupart des pulvérisateurs à main ou atomiseurs.

Remplir le pulvérisateur/atomiseur avec la moitié de la quantité d'eau utile au traitement des arbres concernés, puis verser la quantité de talc nécessaire. Bien remuer puis compléter la quantité d'eau en mélangeant continuellement.

Pulvériser/brumiser abondamment toute la partie de l'arbre portant les fruits. Ne pas traiter lors de fortes chaleurs mais de préférence le matin tôt ou en fin d'après-midi.

b) Pour les vergers plus importants: 50kg/ha pour 200 à 250 arbres d'un diamètre d'environ 20 à 25 cm pour le premier traitement, puis réduire à 25 kg/ha pour les traitements suivants.

Il est conseillé d'utiliser un volume de bouillie de 600 l/ha.

NB : il est fortement recommandé d'utiliser un adjuvant mouillant dans le but d'obtenir une meilleure protection du fruit (uniformité et meilleure fixation).

EFFICACITÉ Barrière physique minérale : La durée de protection du fruit est de l'ordre de 3-4 semaines sauf précipitations (> à 15 mm) entre-temps. Attention : Le fruit peut se retrouver légèrement "blanchi" lors de la récolte si les précipitations ne l'ont pas lessivé. Densité : 0,8 kg/dm³.

PÉRIODE D'EMPLOI • Cerisiers : au plus tard avant que les fruits entrent en véraison. • Oliviers : dès que l'olive mesure 1 cm. • Poiriers : traitements précoces en février/ mars. • Abricotiers, pommiers : dès le mois de mai. • Noyers : début juillet - fin

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Penser à agiter régulièrement le mélange obtenu de sorte que le talc reste en suspension. Port d'un masque conseillé lors d'une application prolongée.